

**Examenul de bacalaureat național 2019**

**Proba E. c)**

**Matematică *M\_șt-nat***

**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

**Model**

*Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii*

- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

**SUBIECTUL I**

- Pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
- Nu se acordă punctaje intermediare.

**SUBIECTUL al II-lea și SUBIECTUL al III-lea**

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.

**SUBIECTUL I**

**(40 de puncte)**

1.	B	4p
2.	C	4p
3.	A	4p
4.	B	4p
5.	D	4p
6.	B	4p
7.	C	4p
8.	A	4p
9.	C	4p
10.	D	4p

**SUBIECTUL al II-lea**

**(20 de puncte)**

1.a)	$\det(A(a)) = \begin{vmatrix} 2 & a & 1 \\ 3 & 2a-1 & 1 \\ a-3 & a & 1 \end{vmatrix} = -a^2 + 6a - 5$ <p><math>a = 1</math> sau <math>a = 5</math></p>	3p 2p
b)	<p>Pentru <math>a = 1</math>, sistemul este <math>\begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ 3x + y + z = 1 \\ -2x + y + z = 1 \end{cases}</math> și, scăzând primele două ecuații, obținem</p> <p><math>x_0 = 0</math> și <math>y_0 + z_0 = 1</math></p> <p>Cum <math>x_0^2 = y_0 z_0 \Rightarrow y_0 z_0 = 0</math>, soluțiile sunt <math>(0, 1, 0)</math> sau <math>(0, 0, 1)</math>, care convin</p>	3p 2p
2.a)	<p><math>x * x = 5(x-1)^2 + 1</math>, <math>x * x * x = 25(x-1)^3 + 1</math></p> <p><math>(x-1)^3 &lt; 1 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 2)</math></p>	2p 3p
b)	<p><math>25\left(\frac{1}{n}-1\right)\left(\frac{1}{n}+1\right)\left(\frac{1}{n+1}-1\right)\left(\frac{1}{n+1}+1\right)\left(\frac{1}{n+2}-1\right)\left(\frac{1}{n+2}+1\right)+1=-19 \Leftrightarrow \frac{(1-n)(n+3)}{n(n+2)} = -\frac{4}{5}</math></p> <p>Cum <math>n</math> este număr natural nenul, obținem <math>n = 3</math></p>	3p 2p

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

1.a)	$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2x-2(x-1)}{x^2} =$ $= \frac{x-2x+2x-2}{x^2} = \frac{x-2}{x^2}, x \in (0, +\infty)$	3p 2p
------	---	----------

<b>b)</b>	Tangenta la graficul funcției $f$ în punctul $(a, f(a))$ este perpendiculară pe dreapta de ecuație $y = x \Leftrightarrow f'(a) = -1$ $\frac{a-2}{a^2} = -1 \Leftrightarrow a^2 + a - 2 = 0 \Leftrightarrow a = -2$ , care nu convine, $a = 1$ , care convine	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>c)</b>	$f'(x) < 0$ , pentru orice $x \in (0, 2) \Rightarrow f$ este strict descrescătoare pe $(0, 2)$ $0 < 1 < \frac{\pi}{2} < 2 \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{2}\right) < f(1)$ și, cum $f(1) = 0$ , obținem $f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>2.a)</b>	$\int_0^3 f(x) dx = \int_0^3 (x^2 + 1) dx = \left(\frac{x^3}{3} + x\right)\Big _0^3 =$ $= \frac{27}{3} + 3 - 0 = 12$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>b)</b>	$g(x) = \frac{x}{x^2 + 1} \Rightarrow \mathcal{A} = \int_0^1  g(x)  dx = \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)\Big _0^1 =$ $= \frac{1}{2} \ln 2$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>c)</b>	Funcția $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , $h(x) = \int_0^x e^{f(t)} dt - x$ este derivabilă și $h'(x) = e^{x^2+1} - 1$ $h'(x) > 0$ pentru orice număr real $x$ , deci funcția $h$ este strict crescătoare pe $\mathbb{R}$ , deci injectivă și, cum $h(0) = 0$ , există un unic număr real $x$ pentru care $\int_0^x e^{f(t)} dt = x$	<b>2p</b> <b>3p</b>