

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI SIBIU NR. SB - 21696/08.12.2022	MINISTERUL EDUCAȚIEI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SIBIU NR. 11635 108.12.2022
--	---

CĂTRE**TOATE UNITĂȚILE DE EDUCAȚIE SI ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN
MUNICIPIU SIBIU**

Sezonul actual al virozelor și infecțiilor respiratorii a debutat anul acesta mai devreme, cu forme mai severe de îmbolnăvire și cu o mare diversitate de agenți patogeni, afectând preponderent copiii. Se estimează că vârful sezonului va fi atins în cursul următoarelor două – trei luni. De mai multe săptămâni, sistemul medical pediatric se confruntă cu un număr mare de prezentări – copii cu simptome respiratorii grave, o parte dintre aceștia necesitând internare. Spitalul Clinic de Pediatric din Sibiu, secțiile de pediatrie și de pneumologie pediatrică din județ sunt supra - aglomerate.

În acest context, pentru prevenirea îmbolnăvirilor în colectivitățile de preșcolari și școlari, precum și pentru depistarea precoce a acestora, în urma întâlnirii comune de lucru între reprezentanții Primăriei Municipiului Sibiu – Serviciul public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, Inspectoratului Școlar Județean Sibiu și ai Direcției de Sănătate Publică Sibiu, s-au identificat soluții pentru asigurarea prezenței personalului medical pentru efectuarea triajului epidemiologic zilnic al copiilor din grădinițe și creșe (la sosirea copiilor în unitate). Pentru buna desfășurare a acestor activități, conducerile unităților de învățământ vor sprijini personalul medical și vor dispune măsurile necesare, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației nr. 438/4629/2021. În acest sens, **"nu vor fi admisi în colectivitate copiii care prezintă: angină cu febră, angină cu depozite pultacee, angină cu secreții nazale muco-purulente, sindrom tusigen cu febră, conjunctivită acută, ochi roșu până la diagnosticare, subicter și icter până la diagnosticare, erupții cutanate cu potențial infecto- contagios, până la diagnosticare"**.

Se recomandă, de asemenea, supravegherea atentă și efectuarea triajului observational ale copiilor din învățământul primar de către cadrele didactice (învățător/învățătoare) și

anunțarea imediată a personalului din cabinetul medical școlar în cazul identificării unor simptome de infecție respiratorie la aceștia (tuse, strănut, febră, secreții nazale abundente, etc.).

Anexat vă comunicăm principalele măsuri de prevenție în unitățile de învățământ și recomandări pentru părinți.

Director executiv,

Ec. Cojocaru Nicolae Horatiu



Inspector școlar general,

Prof. Novac Emilian - Marius



Măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor în unitatea de învățământ:

1. Identificarea unui spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire, până la preluarea de către părinți/reprezentanți legali;
2. Recomandare adresată părinților să nu își trimită în colectivitate copiii cu simptomatologie respiratorie și să se adreseze medicului de familie;
3. Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție în cantități suficiente;
4. Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei;
5. Este obligatorie asigurarea permanentă la grupurile sanitare a săpunului lichid, substanțelor dezinfectante și a prosoapelor de hârtie, de unică folosință;
6. Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfecției regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent, conform planului de curățenie și dezinfecție de la nivelul unității;
7. Elevii nu vor schimba între ei alimente și obiecte de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.); jucările vor fi frecvent curățate și dezinfectate;
8. Elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă față, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
9. Măsuri de protecție la nivel individual:
 - spălarea și dezinfectarea frecventă a mâinilor;
 - evitarea contaminării print tuse, strănut; menținerea pe cât posibil a distanței minime de protecție sanitară (1 metru față de altă persoană); rămâne recomandabilă purtarea măștii de protecție în spațiile închise, aglomerate.