

**OLIMPIADA DE CHIMIE**  
**etapa județeană/municipiului București**  
**23 martie 2024**  
**Clasa a XII-a**

**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

**SE PUNCTEAZĂ CORESPUNZĂTOR ORICE FORMULARE/MODALITATE DE REZOLVARE CORECTĂ A CERINȚELOR.**

**Subiectul I** **25 de puncte**

**A) (8 puncte)**

a) $P_4(\text{alb, s}) + 5O_2(g) \rightarrow P_4O_{10}(\text{s})$	<b>3p</b>
b) $2PCl_3(\ell) + O_2(g) \rightarrow 2POCl_3(\ell) \quad \Delta_rH_1^\circ = -554 \text{ kJ} \quad   \cdot 5$ $P_4O_{10}(\text{s}) + 6PCl_5(\text{s}) \rightarrow 10POCl_3(\ell) \quad \Delta_rH_2^\circ = -346 \text{ kJ} \quad   \cdot (-1)$ $P_4(\text{alb, s}) + 6Cl_2(g) \rightarrow 4PCl_3(\ell) \quad \Delta_rH_3^\circ = -1280 \text{ kJ} \quad   \cdot \frac{5}{2}$ $P_4(\text{alb, s}) + 10Cl_2(g) \rightarrow 4PCl_5(\text{s}) \quad \Delta_rH_4^\circ = -1760 \text{ kJ} \quad   \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)$ $P_4(\text{alb, s}) + 5O_2(g) \rightarrow P_4O_{10}(\text{s}) \quad \Delta_rH^\circ = ?$ $\Delta_rH^\circ = 5 \cdot \Delta_rH_1^\circ - \Delta_rH_2^\circ + \frac{5}{2} \cdot \Delta_rH_3^\circ - \frac{3}{2} \cdot \Delta_rH_4^\circ \Rightarrow \Delta_rH^\circ = -2984 \text{ kJ}$	<b>4p</b>
$\Delta_rH^\circ = 1 \cdot \Delta_fH_{P_4O_{10}(\text{s})} \Rightarrow \Delta_fH_{P_4O_{10}(\text{s})} = -2984 \text{ kJ/mol}$	<b>1p</b>

**B. (17 puncte)**

a) Zincul reacționează cu soluția de hidroxid de sodiu: $Zn(\text{s}) + 2NaOH(\text{aq}) + 2H_2O(\ell) \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4](\text{aq}) + H_2(g)$	<b>3p</b>
$V_{H_2} = 5,6 \text{ L (c.n.)} \Rightarrow m_{Zn} = 16,25 \text{ g}$ $\%Zn = \frac{m_{Zn}}{m_{\text{aliaj}}} \cdot 100 = 40\% \quad   \text{ (procente de masă)}$ $\%Cu = 100 - 40 = 60\%$	<b>4p</b>
b) $Q_{\text{alamă}} = Q_{Zn} + Q_{Cu} \Rightarrow m_{\text{alamă}} \cdot c_{\text{alamă}} \cdot \Delta T = (m_{Zn} \cdot c_{Zn} + m_{Cu} \cdot c_{Cu}) \cdot \Delta T \Rightarrow$ $m_{\text{alamă}} \cdot c_{\text{alamă}} = \frac{40}{100} \cdot m_{\text{alamă}} \cdot c_{Zn} + \frac{60}{100} \cdot m_{\text{alamă}} \cdot c_{Cu} \Rightarrow c_{\text{alamă}} = \frac{40}{100} \cdot c_{Zn} + \frac{60}{100} \cdot c_{Cu} \Rightarrow$ $c_{\text{alamă}} = 0,384 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	<b>5p</b>
c) Doar o parte din gheăță se topește. Rezultă că temperatura de echilibru este $t_e = 0^\circ\text{C}$ . $ Q_{\text{cedat}}  = Q_{\text{primit}} \Rightarrow$ $m_{\text{alamă}} \cdot c_{\text{alamă}} \cdot (t_1 - t_e) = C \cdot (t_e - t_o) + m_{H_2O(\text{s})} \cdot c_{H_2O(\text{s})} \cdot (t_e - t_o) + x \cdot \lambda_{t_{H_2O(\text{s})}}$ $x = \frac{m_{\text{alamă}} \cdot c_{\text{alamă}} \cdot 40 - 10 \cdot C - 10 \cdot m_{H_2O(\text{s})} \cdot c_{H_2O(\text{s})}}{\lambda_{t_{H_2O(\text{s})}}} = 0,075 \text{ kg} = 75 \text{ g gheăță topită}$	<b>5p</b>

**Subiectul al II-lea**

**25 de puncte**

<b>a)</b> $C_6H_5-COOH(s) + \frac{15}{2}O_2(g) \rightarrow 7CO_2(g) + 3H_2O(l) \quad \Delta_c U_{C_6H_5-COOH(s)}^\circ = -3251 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	<b>3p</b>
<b>b)</b> La volum constant, căldura cedată la combustie este egală cu variația energiei interne. Căldura eliberată la combustia acidului benzoic este preluată de sistemul calorimetric, a cărui capacitate calorică este C. $Q_{cedat} = n_{C_7H_6O_2} \cdot \Delta_c U_{C_7H_6O_2(s)}^\circ$ $\Delta_c U_{C_7H_6O_2(s)}^\circ = -3251 \text{ kJ/mol} = -3251 \cdot 10^3 \text{ J/mol}$ $ Q_{cedat}  = Q_{primit} \Rightarrow n_{C_7H_6O_2} \cdot  \Delta_c U_{C_7H_6O_2(s)}^\circ  = C \cdot \Delta T_l \Rightarrow C = \frac{n_{C_7H_6O_2} \cdot  \Delta_c U_{C_7H_6O_2(s)}^\circ }{\Delta T_l}$ $C = \frac{\frac{0,689}{122} \cdot 3251 \cdot 10^3}{1,8} = 10200 \frac{\text{J}}{\text{K}}$	<b>5p</b>
<b>c)</b> Căldura eliberată la combustia alcanului ( <b>A</b> ) este preluată de sistemul calorimetric, a cărui capacitate calorică este $C = 10200 \text{ J/K}$ . $Q_{cedat} = n_{C_8H_{18}} \cdot \Delta_c U_{C_8H_{18}(l)}^\circ$ $ Q_{cedat}  = Q_{primit} \Rightarrow n_{C_8H_{18}} \cdot  \Delta_c U_{C_8H_{18}(l)}^\circ  = C \cdot \Delta T_2 \Rightarrow \Delta_c U_{C_8H_{18}(l)}^\circ = -\frac{C \cdot \Delta T_2}{n_{C_8H_{18}}}$ $\Delta_c U_{C_8H_{18}(l)}^\circ = -\frac{10200 \cdot 2,67}{5 \cdot 10^{-3}} = -5467200 \text{ J/mol} = -5467,2 \text{ kJ/mol}$	<b>5p</b>
$C_8H_{18}(l) + \frac{25}{2}O_2(g) \rightarrow 8CO_2(g) + 9H_2O(l) \quad \Delta_r H^\circ$	<b>3p</b>
$\Delta n_{gaze} = n_{CO_2} - n_{O_2} = 8 - \frac{25}{2} = -4,5 \text{ mol gaze}$ Conform principiului I al termodinamicii, $\Delta U = Q + L$ . La presiune constantă, $Q_P = \Delta_c H^\circ$ și $L = -p \cdot \Delta V = -\Delta n_{gaze} \cdot R \cdot T$ $\Rightarrow \Delta_c H_{C_8H_{18}(l)}^\circ = \Delta_c U_{C_8H_{18}(l)}^\circ + \Delta n_{gaze} RT$ $\Delta_c H_{C_8H_{18}(l)}^\circ = -5467,2 \cdot 10^3 - 4,5 \cdot 8,314 \cdot 298 = -5478349 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} = -5478,35 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	<b>5p</b>
<b>d)</b> $C_8H_{18}(l) + \frac{25}{2}O_2(g) \rightarrow 8CO_2(g) + 9H_2O(l)$ $\Delta_r H^\circ = 1 \cdot \Delta_c H_{C_8H_{18}(l)}^\circ \Rightarrow \Delta_r H^\circ = -5478,35 \text{ kJ}$ $\Delta_r H^\circ = 8 \cdot \Delta_f H_{CO_2(g)}^\circ + 9 \cdot \Delta_f H_{H_2O(l)}^\circ - \Delta_f H_{C_8H_{18}(l)}^\circ \Rightarrow$ $\Delta_f H_{C_8H_{18}(l)}^\circ = 8 \cdot \Delta_f H_{CO_2(g)}^\circ + 9 \cdot \Delta_f H_{H_2O(l)}^\circ - \Delta_r H^\circ$ $\Delta_f H_{C_8H_{18}(l)}^\circ = -239,15 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	<b>4p</b>

**Subiectul al III-lea**

**25 de puncte**

**A. (10 puncte)**

**a)**

$$\ln \frac{C_o}{C_A} = k_1 \cdot t$$

$$t = t_{1/2} \Rightarrow C_A = \frac{C_o}{2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_1} \Rightarrow t_{1/2} = 1732,8 \text{ s}$$

**3p**

**b)**

Notăm cu  $x$  gradul de descompunere al reactantului A(g)

$$x = \frac{n_{A(\text{react})}}{n_o} = \frac{P_{A(\text{react})}}{P_o} \Rightarrow P_{A(\text{react})} = x \cdot P_o$$

La momentul  $t$ :

$$P_A = P_o - P_{A(\text{react})} = P_o(1-x)$$

Momentul	$P_A$	$P_B$	$P_C$	$P$
$t = 0$	$P_o$	-	-	
$t$	$P_o(1-x)$	$x \cdot P_o$	$x \cdot P_o$	$P_o(1+x)$

$$P = P_o(1+x)$$

$$\ln \frac{P_o}{P_A} = k_1 t \Rightarrow \ln \frac{P_o}{P_o(1-x)} = k_1 t \Rightarrow \ln \frac{1}{1-x} = k_1 t \Rightarrow 1-x = e^{-k_1 t} \Rightarrow x = 1-e^{-k_1 t}$$

$$P = P_o(1+x) \Rightarrow P = P_o(2-e^{-k_1 t}) \Rightarrow P = 600 \cdot \left(2 - e^{-4 \cdot 10^{-4} \cdot 3600}\right) \Rightarrow P = 1057,85 \text{ Torr}$$

**5p**

**c)**

$$\ln \frac{P_o}{P_A} = k_1 t \Rightarrow P_A = P_o \cdot e^{-k_1 t} \Rightarrow P_A = 229,74 \text{ Torr}$$

**2p**

**B. (15 puncte)**

**a)**

$$\frac{1}{C_A} - \frac{1}{C_o} = 2k_2 \cdot t$$

$$t = t_{1/2} \Rightarrow C_A = \frac{C_o}{2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{1}{2k_2 C_o}$$

$$P_i \cdot V = n_i RT \Rightarrow P_i = \frac{n_i}{V} \cdot RT \Rightarrow P_i = C_{M_i} \cdot RT \Rightarrow C_{M_i} = \frac{P_i}{RT}$$

$$k_2 = 8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{2k_2 C_o} = \frac{RT}{2k_2 P_o} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{0,082 \cdot 1000}{2 \cdot 8 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{600}{760}} \Rightarrow t_{1/2} = 6491,6 \text{ s}$$

**5p**

**b)**

Notăm cu  $2x$  gradul de descompunere al reactantului A(g)

$$2x = \frac{C_{A(\text{react})}}{C_o} = \frac{P_{A(\text{react})}}{P_o} \Rightarrow P_{A(\text{react})} = 2x \cdot P_o$$

La momentul t, presiunea parțială a reactantului A este:

$$P_A = P_0 - P_{A(\text{react})} = P_0 - 2x \cdot P_0 = P_0(1 - 2x)$$

Momentul	$P_A$	$P_D$	$P_E$	$P$
$t = 0$	$P_0$	-	-	
$t$	$P_0(1 - 2x)$	$x \cdot P_0$	$x \cdot P_0$	$P_0$

La momentul t:  $P = P_0 = 600$  Torr = const. - reacție fără variația numărului de moli de gaz.

5p

c)

$$\frac{1}{C_A} - \frac{1}{C_0} = 2k_2 \cdot t \Rightarrow \frac{RT}{P_A} = \frac{RT}{P_0} + 2k_2 t \Rightarrow P_A = \frac{P_0 RT}{RT + 2k_2 P_0 t}$$

$$t = 40 \text{ min} = 2400 \text{ s}$$

$$P_A = 0,5763 \text{ atm} \Rightarrow P_A = 438 \text{ Torr}$$

5p

#### Subiectul al IV-lea

25 de puncte

a)

$$\ln \frac{C_0}{C_X} = k_1 \cdot t \Rightarrow k_1 = \frac{1}{t} \cdot \ln \frac{C_0}{C_X}$$

$$t = 5 \text{ min} \Rightarrow k_{(1)} = 7,54 \cdot 10^{-3} \text{ min}^{-1}$$

$$t = 10 \text{ min} \Rightarrow k_{(2)} = 7,47 \cdot 10^{-3} \text{ min}^{-1}$$

$$t = 20 \text{ min} \Rightarrow k_{(3)} = 7,48 \cdot 10^{-3} \text{ min}^{-1}$$

$$t = 30 \text{ min} \Rightarrow k_{(4)} = 7,54 \cdot 10^{-3} \text{ min}^{-1}$$

$$k_{(1)} \approx k_{(2)} \approx k_{(3)} \approx k_{(4)} \Rightarrow \text{reacția este de ordinul 1}$$

4p

b)

$$\bar{k}_1 = \frac{k_{(1)} + k_{(2)} + k_{(3)} + k_{(4)}}{4} = 7,5 \cdot 10^{-3} \text{ min}^{-1}$$

2p

$$t = t_{1/2} \Rightarrow C_X = \frac{C_0}{2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\bar{k}_1} = 92,42 \text{ min}$$

2p

c)

$$t_1 = 15^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 288 \text{ K}$$

$$k_{T_1} = 7,5 \cdot 10^{-3} \text{ min}^{-1}$$

$$t_2 = 30^\circ\text{C} \Rightarrow T_2 = 303 \text{ K}$$

$$\ln \frac{k_{T_2}}{k_{T_1}} = \frac{E_a(T_2 - T_1)}{RT_1 T_2} \Rightarrow k_{T_2} = k_{T_1} \cdot e^{\frac{E_a(T_2 - T_1)}{RT_1 T_2}}$$

$$T_2 = 303 \text{ K} \Rightarrow k_{T_2} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ min}^{-1}$$

4p

d)

După amestecare:

$$|Q_{\text{cedat}}| = Q_{\text{primit}} \Rightarrow m_{s_2} \cdot c \cdot (T_2 - T_e) = m_{s_1} \cdot c \cdot (T_e - T_1) \Rightarrow$$

$$V_{s_2} \cdot \rho \cdot c \cdot (T_2 - T_e) = V_{s_1} \cdot \rho \cdot c \cdot (T_e - T_1) \Rightarrow T_e = 297 \text{ K}$$

$$T_e = 297 \text{ K} \Rightarrow t_e = 24^\circ\text{C}$$

2p

$\ln \frac{k_{T_e}}{k_{T_l}} = \frac{E_a(T_e - T_l)}{RT_l T_e} \Rightarrow k_{T_e} = k_{T_l} \cdot e^{\frac{E_a(T_e - T_l)}{RT_l T_e}}$ $T_e = 297 \text{ K} \Rightarrow k_{T_e} = 1,57 \cdot 10^{-2} \text{ min}^{-1}$	<b>4p</b>
$\ln \frac{C_o}{C_X} = k_1 \cdot t \Rightarrow C_X = C_o \cdot e^{-k_1 \cdot t}$ <b>t = 15 min</b> În Reactorul R <sub>1</sub> : $C_{1X} = 2 \cdot e^{-7,5 \cdot 10^{-3} \cdot 15} = 1,787 \text{ mol/L} \Rightarrow n_{1X} = C_M \cdot V_s = 1,787 \cdot 2 = 3,574 \text{ mol X}$	
În reactorul R <sub>2</sub> : $C_{2X} = 1 \cdot e^{-2,5 \cdot 10^{-2} \cdot 15} = 0,687 \text{ mol/L} \Rightarrow n_{2X} = C_M \cdot V_s = 0,687 \cdot 3 = 2,061 \text{ mol X}$	<b>2p</b>
După amestecare: $C_{o_X} = \frac{n_{1X} + n_{2X}}{V_{s_1} + V_{s_2}} = \frac{3,574 + 2,061}{2 + 3} = 1,127 \text{ mol/L}$	<b>2p</b>
<b>t = 10 min</b> $T_e = 297 \text{ K} \Rightarrow k_{T_e} = 1,57 \cdot 10^{-2} \text{ min}^{-1}$ $\ln \frac{C_o}{C_X} = k_1 \cdot t \Rightarrow C_X = C_o \cdot e^{-k_{T_e} \cdot t}$ $C_X = 0,963 \text{ mol/L}$	<b>3p</b>

**Barem elaborat de:**

Prof. Vasile Sorohan, Colegiul Național "Costache Negrucci" din Iași

Prof. Iuliana Shahaani, Colegiul Național "Matei Basarab" din București

Prof. Carmen Argeșanu, Colegiul Național "Nichita Stănescu" din Ploiești

Prof. Gabi Micu, Colegiul Național Militar "Alexandru Ioan Cuza" din Constanța